



VYVGART Hytrulo®
(efgartigimod alfa and hyaluronidase-qvfc)

COMIENCE CON LA **AUTOINYECCIÓN**

La jeringa precargada de VYVGART Hytrulo puede adaptarse a su día.

Esta guía no debe usarse como sustituto de la [Información para el paciente](#) ni de las [Instrucciones de uso](#) y solo proporciona una descripción general del proceso de autoinyección. Revise detenidamente la [Información para el paciente](#) y el documento de [Instrucciones de uso](#) paso a paso que se encuentra dentro de la caja de VYVGART Hytrulo antes de cada inyección.

¿Qué es VYVGART HYTRULO® (efgartigimod alfa e hialuronidasa-qvfc)?

VYVGART HYTRULO es un medicamento con receta que se usa para tratar la miastenia grave generalizada (MGg) en adultos que son positivos para anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (AChR).

VYVGART HYTRULO es un medicamento con receta que se usa para el tratamiento de adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC).

Se desconoce si VYVGART HYTRULO es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No tome VYVGART HYTRULO si es alérgico al efgartigimod alfa, la hialuronidasa o a cualquiera de los demás ingredientes de VYVGART HYTRULO. VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas graves y disminución de la presión arterial, lo que provoca desmayos.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la [Información de prescripción completa adjunta](#) y la [Información para el paciente adjunta](#) de VYVGART HYTRULO.

La autoinyección puede adaptarse a su vida, sus planes, sus horarios



Precargada y puede ir adonde vaya



- **Inyéctese en su propio espacio**, ya sea en la mesa de su cocina o en la habitación de un hotel mirando el paisaje.*
- Se inyecta debajo de la piel (subcutánea).

La autoinyección puede significar más tiempo en su día para las cosas que ama



- **Autoinyéctese** la jeringa precargada de VYVGART Hytrulo en unos 20-30 segundos.*

*Consulte la **Información para el paciente**. Siga los pasos de administración adecuados y las instrucciones de almacenamiento y manipulación en las **Instrucciones de uso**. Monitoree para detectar signos y síntomas de una reacción alérgica durante al menos 30 minutos después de la inyección. Si se produce una reacción alérgica, debe buscar atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Antes de usar VYVGART HYTRULO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes, si: tiene una infección o fiebre; ha recibido recientemente o tiene programado recibir alguna vacuna; tiene antecedentes de reacciones alérgicas; tiene problemas de riñón (renales). Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa adjunta y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

Apoyo desde el principio

Capacitación personalizada

- Usted y/o su cuidador recibirán **capacitación personalizada** en el hogar o en el consultorio de su médico hasta que esté listo para aplicarse la inyección por su cuenta.
- También recibirá un kit de demostración para ayudarle a practicar.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Antes de usar VYVGART HYTRULO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes, si: está embarazada o planea quedar embarazada; está en período de lactancia o planifica amamantar. Se desconoce si VYVGART HYTRULO puede dañar a un bebé en gestación. Se desconoce si el VYVGART HYTRULO pasa a la leche materna. Registro de exposición durante el embarazo. Existe un registro de exposición durante el embarazo para mujeres que usan VYVGART HYTRULO durante el embarazo. El propósito de este registro consiste en recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Su proveedor de atención médica puede inscribirla en este registro. También puede inscribirse usted misma u obtener más información sobre el registro llamando al 1-855-272-6524 o visitando VYVGARTPregnancy.com.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa adjunta y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

Prepare su espacio

- ✓ Asegúrese de leer la **Información para el paciente** y las **Instrucciones de uso** antes de cada inyección.
- ✓ Saque la caja de la jeringa precargada de VYVGART Hytrulo del refrigerador. Retire 1 jeringa precargada. Vuelva a colocar la caja con otras jeringas en el refrigerador para usarlas en otro momento.
- ✓ Retire la jeringa precargada de la bandeja y verifique la fecha de vencimiento. **No** use la jeringa precargada si ha pasado la fecha de vencimiento.
- ✓ Verifique el estado de la jeringa precargada y la tapa. **No** la use si la tapa está agrietada, rota, dañada o si falta la tapa.
- ✓ Verifique que el medicamento tenga un color de transparente a amarillento; está bien si el medicamento está ligeramente turbio. **No** lo use si el medicamento cambió de color o contiene partículas.
- ✓ Coloque la jeringa precargada sobre una superficie limpia y plana. Deje reposar durante al menos 30 minutos para que el medicamento tome temperatura ambiente. **No** intente entibiar la jeringa precargada de ninguna otra manera.
- ✓ **No** use la jeringa precargada si ha estado a temperatura ambiente durante más de 30 días.

Mientras espera, reúna el resto de los suministros



1 aguja de seguridad



1 hisopo con alcohol



1 recipiente para
desechar objetos
puncocortantes



1 gasa estéril o apósito
adhesivo pequeño
(según lo necesite)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

VYVGART HYTRULO puede causar efectos secundarios que pueden ser graves, entre ellos, infección. VYVGART HYTRULO puede aumentar el riesgo de tener infecciones. Si tiene una infección activa, su proveedor de atención médica debe retrasar su tratamiento con VYVGART HYTRULO hasta que desaparezca la infección. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas de infección: fiebre; escalofríos; micción frecuente y dolorosa; tos; dolor y obstrucción de las fosas nasales; sibilancias; dificultad para respirar; dolor de garganta; exceso de flema; rinorrea.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa adjunta y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

Prepare la jeringa precargada




- ✓ Lávese bien las manos con agua y jabón.
- ✓ Abra cuidadosamente el envase de la aguja de seguridad y retire la aguja. Deseche el envase en la basura doméstica.
- ✓ Doble la tapa de la jeringa precargada hacia un lado para partirla y retirarla de la jeringa precargada. Deseche la tapa de la jeringa precargada en la basura doméstica. **No** toque la punta de la jeringa precargada después de retirar la tapa.
- ✓ Sostenga la jeringa precargada con una mano y coloque la aguja de seguridad. Gire la aguja (en sentido horario) hacia la derecha hasta que sienta resistencia. La aguja de seguridad ya está conectada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

VYVGART HYTRULO puede causar efectos secundarios graves, incluidas reacciones alérgicas (reacciones de hipersensibilidad). VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas que pueden ser graves. Estas reacciones pueden ocurrir durante, poco después o semanas después de la inyección de VYVGART HYTRULO. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de reacción alérgica: erupción cutánea, hinchazón de la cara, los labios, la garganta o la lengua, dificultad para respirar, urticaria, problemas para respirar, presión arterial baja, desmayos.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa adjunta y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

Elija y limpie el área de inyección



- ✓ Elija un área del estómago que esté al menos a 2 pulgadas del ombligo. Cambie el lugar de inyección la próxima vez que se inyecte VYVGART Hytrulo. **No** se inyecte en piel irritada, enrojecida, con moretones, infectada o sensible. **No** se inyecte en piel dura, cicatrizada o con lunares. **No** se inyecte en una vena. VYVGART Hytrulo es solo para inyección debajo de la piel (subcutánea).
- ✓ Limpie el lugar de inyección elegido con un hisopo con alcohol y deje secar al aire. **No** sople ni toque el lugar de inyección después de que se haya limpiado.


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

VYVGART HYTRULO puede causar efectos secundarios que pueden ser graves, entre ellos, reacciones relacionadas con la infusión o la inyección. VYVGART HYTRULO puede causar reacciones relacionadas con la infusión o la inyección. Estas reacciones pueden ocurrir durante la inyección de VYVGART HYTRULO o poco después de esta. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas de una reacción relacionada con la infusión o la inyección: presión arterial alta; escalofríos; temblores; dolor de pecho, estómago o espalda.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa adjunta y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

Prepárese para la inyección

- ✓ Retire el protector de la aguja. Usará el protector de la aguja después de la inyección para cubrir la aguja y prevenir lesiones por pinchazos de aguja.
- ✓ Sostenga el cuerpo de la jeringa precargada y retire la tapa transparente de la aguja separándola de la aguja en línea recta.
- ✓ Deseche la tapa de la aguja en la basura doméstica. **No** vuelva a tapar la aguja.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Los efectos secundarios más frecuentes de VYVGART HYTRULO incluyen infección de las vías respiratorias, dolor de cabeza, infección de las vías urinarias y reacciones en el lugar de inyección. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VYVGART HYTRULO. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa adjunta y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

Inyéctese con la jeringa precargada de VYVGART Hytrulo



Pellizque el lugar de inyección limpio. No pellizque demasiado la piel, ya que esto puede causar moretones.



Mientras pellizca la piel, inserte la aguja en un ángulo de 45 a 90 grados en todo el recorrido, en la piel pellizcada. Luego, suelte la piel pellizcada.



Presione lentamente el apoyo para el pulgar hasta el fondo, hasta que no quede medicamento en la jeringa.

Tardará alrededor de 20 a 30 segundos en inyectarse todo el medicamento.


- Sentirá resistencia a medida que presiona hacia abajo. Inyecte más lentamente en caso de que sienta molestias.
- Está bien si necesita hacer una pausa o cambiar el agarre durante la inyección.
- **No** intente empujar el apoyo para el pulgar hacia abajo rápidamente, ya que esto dificultará presionarlo.



Después de inyectar todo el medicamento, retire la aguja de la piel tirando de ella hacia afuera sin cambiar el ángulo en que se introdujo.

Consulte la **Información para el paciente**. Siga los pasos de administración adecuados y las instrucciones de almacenamiento y manipulación en las **Instrucciones de uso**. Monitoree para detectar signos y síntomas de una reacción alérgica durante al menos 30 minutos después de la inyección. Si se produce una reacción alérgica, debe buscar atención médica.

Deseche la jeringa usada



Empuje cuidadosamente el protector de la aguja sobre la aguja hasta que encaje en su lugar y cubra la aguja. Esto ayuda a prevenir lesiones por pinchazos de aguja. **No** vuelva a tapar la aguja con la tapa transparente. Solo use el protector de la aguja para cubrir la aguja.



Deseche la jeringa precargada usada, con la aguja todavía conectada, en un recipiente para desechar objetos punzocortantes aprobado por la FDA inmediatamente después del uso. **No** deseche agujas ni jeringas sueltas en la basura doméstica.

Tratar el lugar de inyección



Si hay una pequeña cantidad de sangre o líquido en el lugar de inyección, presione el área con una gasa estéril hasta que se detenga el sangrado. Si es necesario, puede aplicar una pequeña venda adhesiva.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No tome VYVGART HYTRULO si es alérgico al efgartigimod alfa, la hialuronidasa o a cualquiera de los demás ingredientes de VYVGART HYTRULO. VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas graves y disminución de la presión arterial, lo que provoca desmayos.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa adjunta y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

No tome VYVGART HYTRULO si es alérgico al efgartigimod alfa, la hialuronidasa o a cualquiera de los demás ingredientes de VYVGART HYTRULO. VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas graves y disminución de la presión arterial, lo que provoca desmayos.

Antes de tomar VYVGART HYTRULO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes, si:

- Tiene una infección o fiebre.
- Ha recibido recientemente o tiene programado recibir alguna vacuna.
- Tiene antecedentes de reacciones alérgicas.
- Tiene problemas de riñón (renales).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si VYVGART HYTRULO puede dañar a un bebé en gestación.
 - Registro de exposición durante el embarazo. Existe un registro de exposición durante el embarazo para mujeres que usan VYVGART HYTRULO durante el embarazo. El propósito de este registro consiste en recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Su proveedor de atención médica puede inscribirla en este registro. También puede inscribirse usted misma u obtener más información sobre el registro llamando al 1-855-272-6524 o visitando VYVGARTPregnancy.com
- Está en período de lactancia o planifica amamantar. Se desconoce si el VYVGART HYTRULO pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

VYVGART HYTRULO puede causar efectos secundarios que pueden graves, como los siguientes:

- **Infección.** VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas que pueden ser graves. Estas reacciones pueden ocurrir durante, inmediatamente después o semanas después de la inyección de VYVGART HYTRULO. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas de infección:
 - Fiebre
 - Escalofríos
 - Micción frecuente y dolorosa
 - Tos
 - Dolor y obstrucción de las fosas nasales
 - Sibilancias
 - Dificultad para respirar
 - Dolor de garganta
 - Exceso de flema
 - Rinorrea

- **Reacciones alérgicas (reacciones de hipersensibilidad).** VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas que pueden ser graves. Estas reacciones pueden ocurrir durante, inmediatamente después o semanas después de la inyección de VYVGART HYTRULO. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas de reacción alérgica:

- Erupción cutánea
- Hinchazón de la cara, los labios, la garganta o la lengua
- Dificultad para respirar
- Urticaria
- Problemas para respirar
- Presión arterial baja
- Desmayos

- **Reacciones relacionadas con la infusión o la inyección.** VYVGART HYTRULO puede causar reacciones relacionadas con la infusión o la inyección. Estas reacciones pueden ocurrir durante o inmediatamente después de la inyección de VYVGART HYTRULO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas de una reacción relacionada con la infusión o la inyección:

- Presión arterial alta
- Escalofríos
- Temblores
- Dolor de pecho, estómago o espalda

Los efectos secundarios más frecuentes de VYVGART HYTRULO incluyen infección de las vías respiratorias, dolor de cabeza, infección de las vías urinarias y reacciones en el lugar de inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VYVGART HYTRULO. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué es VYVGART HYTRULO® (efgartigimod alfa e hialuronidasa-qvfc)?

VYVGART HYTRULO es un medicamento de venta con receta utilizado para tratar adultos con:

- miastenia grave generalizada (MGg) que son positivos para anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (AChR).
- polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC).

Se desconoce si VYVGART HYTRULO es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente adjunta de VYVGART HYTRULO.

Forma farmacéutica y concentración:

VYVGART Hytrulo está disponible como una inyección subcutánea de dosis única que contiene: 200 mg/ml de efgartigimod alfa y 2,000 U/ml de hialuronidasa por jeringa precargada.

Una autoinyección que puede adaptarse a sus planes



Inyéctese en su propio espacio, ya sea en la mesa de su cocina o en la habitación de un hotel mirando el paisaje.*



Autoinyéctese la jeringa precargada de VYVGART Hytrulo en unos 20-30 segundos.*

My VYVGART® *Path*

Inscríbase en el Programa de apoyo al paciente de VYVGART

Con My VYVGART Path (Mi recorrido con VYVGART), tendrá acceso a recursos y apoyo personalizados durante todo su tratamiento.

Hable con su médico y pida que lo inscriban en My VYVGART Path, o visite inscribirMVP.com para descargar el formulario.

¿Ya está inscrito? Llame al **1-833-MY-PATH-1 (1-833-697-2841)** para hablar con un enfermero administrador de casos.

*Consulte la [Información para el paciente](#). Siga los pasos de administración adecuados y las instrucciones de almacenamiento y manipulación en las [Instrucciones de uso](#). Monitoree para detectar signos y síntomas de una reacción alérgica durante al menos 30 minutos después de la inyección. Si se produce una reacción alérgica, debe buscar atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Antes de usar VYVGART HYTRULO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes, si: tiene una infección o fiebre; ha recibido recientemente o tiene programado recibir alguna vacuna; tiene antecedentes de reacciones alérgicas; tiene problemas de riñón (renales). Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la [Información de prescripción completa adjunta](#) y la [Información para el paciente adjunta](#) de VYVGART HYTRULO.

VYVGART y VYVGART Hytrulo son marcas comerciales registradas de argenx.

Solo para audiencias estadounidenses.

©2026 argenx US-VYV_HYT-25-00259 V2 01/2026