

# VYVGART Hytrulo®

(efgartigimod alfa and hyaluronidase-qvfc)

# Guía para conversar sobre la PDIC con el médico



La PDIC afecta a cada persona de manera diferente y puede cambiar con el tiempo. Es importante que su médico sepa de qué manera la afección afecta sus actividades diarias. Use esta guía para ayudarle a conversar sobre sus síntomas y sus capacidades.

Hay preguntas dentro de esta guía que pueden ayudarle a fomentar la colaboración con su médico y aprovechar al máximo sus conversaciones, incluso evaluar si VYVGART Hytrulo podría ser adecuado para usted.

## → Échelle un vistazo para comenzar

### ¿Qué es VYVGART HYTRULO® (efgartigimod alfa e hialuronidasa-qvfc)?

VYVGART HYTRULO es un medicamento con receta que se usa para el tratamiento de adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC).

Se desconoce si VYVGART HYTRULO es seguro y eficaz en niños.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No tome VYVGART HYTRULO si es alérgico al efgartigimod alfa, la hialuronidasa o a cualquiera de los demás ingredientes de VYVGART HYTRULO. VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas graves y disminución de la presión arterial, lo que provoca desmayos.

**Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de VYVGART HYTRULO.**

# ¿Cómo lo están afectando los síntomas de la PDIC?

**Instrucciones:** Durante su próxima cita, su médico puede hacerle preguntas sobre sus síntomas de PDIC. Considere de qué manera sus síntomas afectan su vida cotidiana. En la siguiente figura marque con un círculo los lugares donde experimenta los síntomas. Luego, use el espacio provisto para describir sus síntomas y cómo estos afectan su vida.

**Fecha de hoy:** \_\_\_\_\_

**Fecha del último tratamiento:** \_\_\_\_\_

## Brazos

*Ejemplo*

**Síntoma:** Debilitamiento

**Impacto:** Se me hace difícil lavarme el cabello

**Síntoma(s):**

\_\_\_\_\_

**Impacto:**

\_\_\_\_\_

## Piernas

*Ejemplo*

**Síntomas:** Pérdida del equilibrio y problemas para caminar


**Impacto:** Se me hace difícil hacer actividades como las compras de comestibles

**Síntoma(s):**

\_\_\_\_\_

**Impacto:**

\_\_\_\_\_



## Manos

*Ejemplo*

**Síntoma:** Entumecimiento

**Impacto:** Se me hace difícil abotonarme una camisa

**Síntoma(s):**

\_\_\_\_\_

**Impacto:**

\_\_\_\_\_

## Pies

*Ejemplo*

**Síntoma:** Pie caído (debilidad del tobillo)

**Impacto:** Se me hace difícil subir y bajar escaleras sin sujetarme del pasamanos

**Síntoma(s):**

\_\_\_\_\_

**Impacto:**

\_\_\_\_\_

¿Utiliza un dispositivo para movilidad? \_\_\_\_\_ En caso afirmativo, indique qué tipo(s): \_\_\_\_\_

¿Ha tenido alguna caída relacionada con sus síntomas de PDIC desde su última visita al médico? \_\_\_\_\_

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de VYVGART HYTRULO.

# Reflexione sobre su tratamiento para la PDIC

VYVGART Hytrulo®  
(efgartigimod alfa and hyaluronidase-qvfc)

Puede resultarle útil plantearse preguntas regularmente sobre su tratamiento actual para la PDIC. Responda las preguntas a continuación para comprender mejor qué tan bien está funcionando para usted.

*Si actualmente no está en tratamiento, omita esta página.*

## 1 ¿Están bien controlados sus síntomas?

- La mayor parte del tiempo       A veces       No a menudo       Nunca

## 2 ¿Con qué frecuencia puede realizar las actividades cotidianas que son importantes para usted?

- La mayor parte del tiempo       A veces       No a menudo       Nunca

## 3 ¿Con qué frecuencia lo afectan a diario los efectos secundarios del tratamiento?

- La mayor parte del tiempo       A veces       No a menudo       Nunca

## 4 ¿Con qué frecuencia se ve afectado su programa de actividades por su tratamiento para la PDIC?

- La mayor parte del tiempo       A veces       No a menudo       Nunca

## ¿Qué aspectos de su tratamiento pueden necesitar ayuda?

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de VYVGART HYTRULO.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

No tome VYVGART HYTRULO si es alérgico al efgartigimod alfa, la hialuronidasa o a cualquiera de los demás ingredientes de VYVGART HYTRULO. VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas graves y disminución de la presión arterial, lo que provoca desmayos.

**Antes de tomar VYVGART HYTRULO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las siguientes, si:**

- Tiene una infección o fiebre.
- Ha recibido recientemente o tiene programado recibir alguna vacuna.
- Tiene antecedentes de reacciones alérgicas.
- Tiene problemas de riñón (renales).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si VYVGART HYTRULO puede dañar a un bebé en gestación.
- Registro de exposición durante el embarazo. Existe un registro de exposición durante el embarazo para mujeres que usan VYVGART HYTRULO durante el embarazo. El propósito de este registro consiste en recopilar información sobre su salud y la de su bebé. Su proveedor de atención médica puede inscribirla en este registro. También puede inscribirse usted misma u obtener más información sobre el registro llamando al 1-855-272-6524 o visitando [VYVGARTPregnancy.com](http://VYVGARTPregnancy.com)
- Está en período de lactancia o planifica amamantar. Se desconoce si el VYVGART HYTRULO pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

**VYVGART HYTRULO puede causar efectos secundarios que pueden ser graves, como los siguientes:**

**• Infección.** VYVGART HYTRULO puede aumentar el riesgo de tener infecciones. Si tiene una infección activa, su proveedor de atención médica debe retrasar su tratamiento con VYVGART HYTRULO hasta que desaparezca la infección. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas de infección:

- Fiebre
- Escalofríos
- Micción frecuente y dolorosa
- Tos
- Dolor y obstrucción de las fosas nasales
- Sibilancias
- Dificultad para respirar
- Dolor de garganta
- Exceso de flema
- Rinorrea

**• Reacciones alérgicas (reacciones de hipersensibilidad).** VYVGART HYTRULO puede causar reacciones alérgicas que pueden ser graves. Estas reacciones pueden ocurrir durante, inmediatamente

después o semanas después de la inyección de VYVGART HYTRULO. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas de reacción alérgica:

- Erupción cutánea
- Hinchazón de la cara, los labios, la garganta o la lengua
- Dificultad para respirar
- Urticaria
- Problemas para respirar
- Presión arterial baja
- Desmayos

**• Reacciones relacionadas con la infusión o la inyección.** VYVGART HYTRULO puede causar reacciones relacionadas con la infusión o la inyección. Estas reacciones pueden ocurrir durante o inmediatamente después de la inyección de VYVGART HYTRULO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes síntomas de una reacción relacionada con la infusión o la inyección:

- Presión arterial alta
- Escalofríos
- Temblores
- Dolor de pecho, estómago o espalda

**Los efectos secundarios más frecuentes de VYVGART HYTRULO incluyen infección de las vías respiratorias, dolor de cabeza, infección de las vías urinarias y reacciones en el lugar de inyección.**

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VYVGART HYTRULO. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

**¿Qué es VYVGART HYTRULO® (efgartigimod alfa e hialuronidasa-qvfc)?**

VYVGART HYTRULO es un medicamento con receta que se usa para el tratamiento de adultos con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC).

Se desconoce si VYVGART HYTRULO es seguro y eficaz en niños.

**Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de VYVGART HYTRULO.**

**Presentaciones y concentraciones:**

VYVGART Hytrulo está disponible como una inyección subcutánea de dosis única que contiene: 200 mg/ml de efgartigimod alfa y 2,000 U/ml de hialuronidasa por jeringa precargada, o 180 mg/ml de efgartigimod alfa y 2,000 U/ml de hialuronidasa por vial.

VYVGART Hytrulo es una marca comercial registrada de argenx.

Solo para audiencias estadounidenses.

©2025 argenx US-VYV\_HYT-25-00220 V1 09/2025

# Hable con su médico sobre VYVGART Hytrulo para autoinyección

VYVGART Hytrulo®  
(efgartigimod alfa and hyaluronidase-qvfc)

## Un enfoque diferente para la PDIC

- ✓ La primera innovación importante en el tratamiento de la PDIC en más de 30 años\*
- ✓ El primer y único tratamiento sin plasma aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para adultos con PDIC
- ✓ Una **autoinyección de ~20-30 segundos**, administrada una vez por semana con una jeringa precargada, para tener más tiempo del día para usted†
- ✓ Usted y/o su cuidador recibirán **capacitación en persona en el hogar o en el consultorio de su médico** hasta que esté listo para aplicarse la inyección por su cuenta. También recibirá un kit de demostración para ayudarle a practicar



\*VYVGART Hytrulo contiene efgartigimod alfa e hialuronidasa, y está específicamente diseñado para unirse a los receptores FcRn.

†Consulte la **Información para el paciente**. Siga los pasos de administración adecuados en las **Instrucciones de uso**. Monitoree para detectar signos y síntomas de una reacción alérgica durante al menos 30 minutos después de la inyección. Si se produce una reacción alérgica, debe buscar atención médica.

FcRn = receptor de Fc neonatal.

**Lleve esta guía a su próxima cita médica para comenzar la conversación.**  
**Obtenga más información en VYVGARTHytruloCIDP-es.com.**



### Información para su médico

Comparta este código QR con su médico para que pueda obtener más información sobre la seguridad y la eficacia de **VYVGART Hytrulo**.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

VYVGART HYTRULO puede causar efectos secundarios que pueden ser graves, entre ellos, infección. VYVGART HYTRULO puede aumentar el riesgo de tener infecciones. Si tiene una infección activa, su proveedor de atención médica debe retrasar su tratamiento con VYVGART HYTRULO hasta que desaparezca la infección. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos y síntomas de infección: fiebre; escalofríos; micción frecuente y dolorosa; tos; dolor y obstrucción de las fosas nasales; sibilancias; dificultad para respirar; dolor de garganta; exceso de flema; rinorrea.

**Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento. Consulte la Información de prescripción completa y la Información para el paciente de VYVGART HYTRULO.**

VYVGART Hytrulo es una marca comercial registrada de argenx.

Solo para audiencias estadounidenses. ©2025 argenx US-VYV\_HYT-25-00220 V1 09/2025

